




A RUSKÓ-FÉLE TERMÉSRITKÍTÁS

Az alábbi, általunk kidolgozott és különféle termesztési körülmények között ellenőrzött metszési eljárás ismertetésével a termelőknek szeretnénk segítséget nyújtani a termés hozam jelentős mértékű emeléséhez.



(Balra) Az első ágvilágban megjelenő termést kitörjük, amint elérte a 2 cm-es méretet. A növény így sokkal több termést köt be a magasabb szinteken.

(Jobbra) Pár hét múltán az állományt megszedjük, mikor a második és a felette lévő szinteken nevelt bogyók egy része már szedésre érett. Csak azokat a terméseket vesszük le, amelyek elérték a kívánt méretet (1-es számmal jelölve).

A kisebb, még növekedésben lévő (2-es számmal jelölt) bogyókat egyelőre a tővön hagyjuk, ezeket – a fejlődés ütemétől függően – 7-10 nap múltán, többségük teljes méretének elérésekor szedjük. E második szedés során minden termést leveszünk, feláldozva azokat, amelyek nem fejlődtek ki kellően. Csak az egészen fiatal bogyókat hagyjuk meg, ha nem érték el a 1,5-2 cm-es méretet.



Az ismertetett módszer alkalmazásával a növény nem a már amúgy is szedésre érett bogyók további hizlalására feccséri energiáját, s a magasabb szinteken ismét jóval több termést fog bekötni.

Az eljárás további előnye, hogy a rövid ízközű fajtáknál kevésbé fenyeget a bogyók beszorulásának veszélye, tehát szebb, szabályosabb lesz a termés.

Egy-egy tő a teljes tenyészidőszak során akár 40%-os többlethozammal is szolgálhat.



A túloldali ábrákon blocky típusú paprikát látunk, de a módszer minden más típuson is éppily hatékonyan alkalmazható.

Az első ágvilágban fejlődő termés kitöréséhez megfelelő mérete különféle paprikatípusoknál (Természetes nagyság)

DUNA-R Kft